

Zadania do omówienia na ćwiczeniach w środę 11.01.2023.

Zadania podobne do zadań wcześniejszych można pominąć, jeśli nie sprawiają trudności.

Zadania należy spróbować rozwiązać przed ćwiczeniami !!!

11. Pochodne wyższych rzędów.

Operacja różniczkowania przypisuje funkcji f jej pochodną f' . Jeżeli dziedzina pochodnej nie jest zbyt zdegenerowana¹, możemy do pochodnej ponownie zastosować operację różniczkowania otrzymując pochodną pochodnej funkcji f . Tak otrzymaną funkcję nazywamy drugą pochodną lub pochodną drugiego rzędu funkcji f i oznaczamy przez f'' . Taką zabawę można kontynuować dalej różniczkując funkcję f'' i otrzymując trzecią pochodną² f''' .

Możemy więc napisać

$$(f')' = f'' \quad \text{oraz} \quad (f'')' = f'''$$

lub

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{df(x)}{dx} \right) = \frac{d^2 f(x)}{(dx)^2} = \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \quad \text{oraz} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 f(x)}{dx^2} \right) = \frac{d^3 f(x)}{dx^3}.$$

Na przykład dla funkcji f określonej wzorem $f(x) = x^{10}$ mamy

$$f'(x) = 10x^9, \quad f''(x) = 90x^8 \quad \text{oraz} \quad f'''(x) = 720x^7.$$

W podobny sposób możemy zdefiniować³ pochodną dowolnego rzędu⁴ naturalnego n jako efekt n -krotnego różniczkowania funkcji. Przy tym pochodne rzędu wyższego niż trzeci lub pochodne o rzędzie, który nie jest konkretną liczbą, zapisujemy w postaci $f^{(n)}$. Tak więc czwartą pochodną funkcji f zapiszemy⁵ jako $f^{(4)}$.

Możemy więc przyjąć następującą definicję rekurencyjną

$$f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

lub w innym zapisie

$$\frac{d^{n+1} f(x)}{dx^{n+1}} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^n f(x)}{dx^n} \right).$$

W uzupełnieniu do tej definicji przyjmujemy, że funkcja jest swoją pochodną zerowego rzędu. Oczywiście pisanie $f^{(0)}$ zamiast f nie ma praktycznego sensu, ale użycie zapisu $f^{(n)}$ w kontekście n mogącego przyjmować wartość 0 będzie przez nas w przyszłości stosowane.

¹Formalnie rzecz biorąc, to różniczkować możemy nawet funkcję, która w żadnym punkcie nie jest różniczkowalna – po prostu jej pochodna jest funkcją o pustej dziedzinie i owa pochodna ma kolejną pochodną o pustej dziedzinie. Jednak chodzi nam tutaj nie o formalistyczne niuanse, a o różniczkowanie, które prowadzi do czegoś interesującego.

²Przypominam, że f' czytamy jako "ef prim". Z kolei f'' czytamy jako "ef bis", a f''' jako "ef ter".

³To, że je sobie zdefiniujemy, nie oznacza jeszcze, że dla każdej funkcji będą istniały.

⁴Możemy też powiedzieć: n -ta pochodna.

⁵Jeśli ktoś bardzo mocno chce zapisać takie pochodne w notacji prim-bis-ter, to nie zapisujemy tych pochodnych dodając kolejne primy, ale imitując zapis rzymski z małymi literami. Nie napiszemy więc f'''' , ale f^{iv} , przy czym zapis taki jest na tyle rzadko stosowany, że nie ma ustalonych reguł co do ewentualnego stawiania kropki nad "i".

W każdym z kolejnych 10 zadań zapisz w postaci liczby całkowitej lub ułamka nieskracalnego wartości trzech pochodnych funkcji w podanym punkcie.

467. $f_1(x) = \sqrt{x}$ $f'_1(25) = \dots\dots\dots$, $f''_1(25) = \dots\dots\dots$, $f'''_1(25) = \dots\dots\dots$

468. $f_2(x) = x \cdot \sqrt{x}$ $f'_2(1/4) = \dots\dots\dots$, $f''_2(1/4) = \dots\dots\dots$, $f'''_2(1/4) = \dots\dots\dots$

469. $f_3(x) = x^2 \cdot \sqrt{x}$ $f'_3(4) = \dots\dots\dots$, $f''_3(4) = \dots\dots\dots$, $f'''_3(4) = \dots\dots\dots$

470. $f_4(x) = \sqrt[3]{x}$ $f'_4(1) = \dots\dots\dots$, $f''_4(1) = \dots\dots\dots$, $f'''_4(1) = \dots\dots\dots$

471. $f_5(x) = x \cdot \sqrt[3]{x}$ $f'_5(1/27) = \dots\dots\dots$, $f''_5(1/27) = \dots\dots\dots$, $f'''_5(1/27) = \dots\dots\dots$

472. $f_6(x) = \ln x$ $f'_6(2) = \dots\dots\dots$, $f''_6(2) = \dots\dots\dots$, $f'''_6(2) = \dots\dots\dots$

473. $f_7(x) = x \cdot \ln x$ $f'_7(1) = \dots\dots\dots$, $f''_7(1) = \dots\dots\dots$, $f'''_7(1) = \dots\dots\dots$

474. $f_8(x) = \operatorname{arctg} x$ $f'_8(1) = \dots\dots\dots$, $f''_8(1) = \dots\dots\dots$, $f'''_8(1) = \dots\dots\dots$

475. $f_9(x) = \operatorname{arctg} x$ $f'_9(2) = \dots\dots\dots$, $f''_9(2) = \dots\dots\dots$, $f'''_9(2) = \dots\dots\dots$

476. $f_{10}(x) = \operatorname{arctg} x$ $f'_{10}(3) = \dots\dots\dots$, $f''_{10}(3) = \dots\dots\dots$, $f'''_{10}(3) = \dots\dots\dots$

W każdym z kolejnych 4 zadań podaj w postaci liczby całkowitej lub ułamka nieskracalnego wartości pochodnej czwartego rzędu danej funkcji w trzech podanych punktach. Jeżeli licznik lub mianownik jest większy od 100, nie musi być zapisany w postaci dziesiętnej (może być zapisany np. w postaci potęgi albo w postaci iloczynu liczb dziesiętnych lub potęg).

477. $f_1(x) = \ln x$

$$f_1^{(4)}(1) = \dots \quad f_1^{(4)}(2) = \dots \quad f_1^{(4)}(3) = \dots$$

478. $f_2(x) = \sin x \cdot \cos x$

$$f_2^{(4)}\left(\frac{\pi}{12}\right) = \dots \quad f_2^{(4)}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \dots \quad f_2^{(4)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \dots$$

479. $f_3(x) = (2x+1)^{5/2}$

$$f_3^{(4)}(0) = \dots \quad f_3^{(4)}(4) = \dots \quad f_3^{(4)}(12) = \dots$$

480. $f_4(x) = \sqrt{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}$

$$f_4^{(4)}(0) = \dots \quad f_4^{(4)}(3) = \dots \quad f_4^{(4)}(8) = \dots$$

481. Wyprowadzić wzór na pochodną rzędu 2019 funkcji $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ określonej wzorem

$$f(x) = e^x \cdot \sin x.$$

Otrzymany wzór powinien mieć prostą postać, bez znaku "Σ", z co najwyżej dwoma znakami "+" i co najwyżej dwoma znakami "-".

482. Wyznaczyć wszystkie takie pary liczb rzeczywistych (a, b) , że funkcja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ określona wzorem

$$f(x) = e^{ax} \cdot \cos(bx)$$

jest równa swojej pochodnej trzeciego rzędu.

483. Wyprowadzić wzór na pochodną rzędu 2022 funkcji

$$f(x) = e^x \sin(x\sqrt{3}).$$

Otrzymany wzór powinien mieć prostą postać, nie zawierającą żadnego ze znaków "Σ", "+", "-".

Wyprowadzić wzór na pochodną rzędu n funkcji zmiennej x danej wzorem⁶:

484. $\ln(x^{10})$	485. \sqrt{x}	486. xe^x	487. e^{4x}	488. $\sin 5x$
489. $x^2 \ln x$	490. $\frac{1-x}{1+x}$	491. $\frac{1}{x^2+x}$	492. $\frac{1}{x^2-1}$	493. $\frac{1}{x^3-x}$

⁶Wskazówka do niektórych zadań: rozłożyć funkcję na sumę wyrażań postaci $\frac{c}{x+a}$.