

## ALGEBRA 1, Lista 14

Konwersatorium 29.01.2018 i Ćwiczenia 31.01.2018 (bez kartkówki).

0S. Materiał teoretyczny: Charakterystyka ciała i podciała. Równania algebraiczne w ciele  $F$ , znajdowanie rozwiązań w rozszerzeniu  $K$  ciała  $F$ . Ciało algebraicznie domknięte: definicja, istnienie (informacyjnie) i nieskończoność. Ciała proste. Podciało proste ciała  $F$ . Liczba elementów ciała skończonego. Funkcja Frobeniusa w ciele charakterystyki  $p > 0$ .

1S. Sporządzić tabelki działań ciała:

- (a) 4-elementowego,
- (b) 9-elementowego.

2K. Które z podanych pierścieni są ciałami?

- (a)  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ .
- (b)  $\mathbb{Z}_4$ .
- (c)  $\mathbb{Z}_{17}$ .
- (d)  $\mathbb{Q}[X]/(X^3 - 3)$ .
- (e)  $\mathbb{Q}[X]/(X^2 + 1)$ .
- (f)  $\mathbb{Z}_5[X]/(X^2 + 1)$ .
- (g)  $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 7)$ .
- (h)  $M_n(\mathbb{R})$ ,  $n > 1$ .

3K. Rozwiązać równanie kwadratowe  $x^2 + x + 1 = 0$

- (a) w ciele  $\mathbb{Z}_7$ ;
- (b) w ciele  $\mathbb{Z}_5$ ;
- (c) w ciele liczb rzeczywistych;
- (d) w ciele liczb zespolonych.

4. Traktujemy ciało  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$  jako przestrzeń liniową nad ciałem  $\mathbb{Q}$ .

- (a) Udowodnić, że zbiór  $\{1, \sqrt{2}\}$  jest bazą tej przestrzeni liniowej.
- (b) Mamy funkcję

$$f : \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{2}], \quad f(x) = (1 + \sqrt{2})x.$$

Sprawdzić, że  $f$  jest przekształceniem liniowym przestrzeni liniowej  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$  nad ciałem  $\mathbb{Q}$ , a następnie obliczyć macierz przekształcenia liniowego  $f$  w bazie  $\{1, \sqrt{2}\}$ .

5. Traktujemy ciało  $\mathbb{R}$  jako przestrzeń liniową nad  $\mathbb{Q}$ . Udowodnić, że wymiar tej przestrzeni liniowej jest nieskończony (dla zainteresowanych: wymiar ten jest nieprzeliczalny i równy  $2^{\aleph_0}$ ).

6. Załóżmy, że  $F$  jest ciałem oraz  $I \triangleleft F$ . Udowodnić, że  $I = \{0\}$  lub  $I = F$ .

7. Załóżmy, że  $f : F_1 \rightarrow F_2$  jest homomorfizmem ciał. Udowodnić, że  $f$  jest monomorfizmem.

8. Załóżmy, że  $R$  niezerowym pierścieniem przemiennym z 1 oraz ideał  $I \triangleleft R$  jest taki, że  $I \neq R$ . Mówimy, że ideał  $I$  jest *pierwszy*, gdy dla wszystkich  $a, b \in R$ ,  $a \cdot b \in I$  pociąga, że  $a \in I$  lub  $b \in I$ . Udowodnić, że:

- (a) ideał  $I$  jest pierwszy wtedy i tylko wtedy, gdy pierścień  $R/I$  jest dziedziną;
- (b) jeśli  $I$  jest maksymalny, to  $I$  jest pierwszy.